

BAQUACIL®

Bruksanvisning for BAQUACIL Check

Gjelder følgende varenumre: 0235

MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER!

MÅ IKKE FORTYNNES FØR TILSETTING!

BAQUACIL Check brukes som aktivator for **BAQUACIL PHMB 2 in 1** og **BAQUACIL Shock** i klorfrie bassenger for å unngå mikrobiologisk vekst og uklarhet i bassenget.

DOSERING:

Ved nyfylling av bassenget:

1. Mål først pH-verdien, som bør være mellom 7,0 og 7,4. Senk pH-verdien med **Saniklar pH-minus** eller hev den med **Saniklar pH-plus**. Kontroller alkaliteten, som bør ligge mellom 80 og 120 mg/l. Juster om nødvendig.
2. Tilsett 2 l **BAQUACIL Shock** per 10 m³ bassengvann.
3. Tilsett 1 dl **BAQUACIL Check** per 10 m³ vann direkte i bassenget foran innløpsdysene med filtersystemet i gang, men uten at noen bader i bassenget.
4. Tilsett 24 timer senere **BAQUACIL PHMB 2 IN 1** etter veiledningen på **PHMB 2 in 1**-etiketten. Det kan bades i bassenget en halv time etter tilsetting.

Ukentlig vedlikehold av bassenget:

1. Mål pH-verdien og juster som beskrevet over. Tilsett oksidasjonsmiddelet **BAQUACIL Shock** ifølge veiledningen på produktetiketten.
2. Kontroller og tilsett desinfeksjonsmiddelet **BAQUACIL PHMB 2 in 1** etter behov ifølge veiledningen på produktetiketten.
3. Tilsett 0,5 dl **BAQUACIL Check** per 10 m³ vann direkte i bassenget med filterpumpen i gang. Det kan bades i bassenget en halv time etter tilsetting.

ADVARSEL! Ikke dryss produktet ut over vannoverflaten, samtidig som noen oppholder seg i vannet. Oppbevar produktet kjølig og tørt i et ventilert rom ved maksimalt 35°C.



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER